

De samenstellingen:

Lori FruitBlend:

Aanvullend diervoeder voor siervogels – Ergänzungsfuttermittel für Ziervögel – Complementary feed for ornamental birds

Samenstelling: maïsbloem, sojameel, tarwebloem, lijnzaad, dextrose, tomaten poeder, curcuma, bietenpulp, dicalciumfosfaat, zonnebloemolie, biergist, calciumcarbonaat, natriumchloride

Zusammensetzung: Maismehl, Sojamehl, Weizenmehl, Leinsaat, Dextrose, Tomaten Pulver, Kurkuma, Beet, Dicalciumphosphat, Sonnenblumenöl, Bierhefe, Calciumcarbonat, Natriumchloride

Composition: maize flour, soya meal, wheat flour, linseed, dextrose, tomato powder, curcuma, beetroot, dicalcium phosphate, sunflower oil, brewer's yeast, calcium carbonate, sodium chloride

Analytische bestanddelen – Analytische Bestandteile – Analytical constituents:

Ruw eiwit – Rohprotein – Crude protein: 18,4 %, Ruw vet – Rohfett – Crude fat: 7,4 %, Ruwe celstof – Rohfaser – Crude fiber: 2,5 %, Ruwe as – Rohasche – Crude ash: 8,7 %, Calcium – Kalzium: 1,8 %, Fosfor – Phosphore: 1,3 %, Natrium – Sodium: 0,2 %

Toevoegingsmiddelen – Zusatzstoffe – Additifs /kg:

Nutritionele toevoegingsmiddelen - Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe - Nutritional additives /kg:

Vitamin(e) A (3a672a): 16000,0 IE, Vitamin(e) D3 (3a671): 1600,0 IE, Vitamin(e) E (3a700): 44,0 mg, Vitamin(e) K3 (3a711): 3,0 mg, Vitamin(e) B1 (3a821): 9,0 mg, Vitamin(e) B2 (3a825ii): 16,0 mg, Cholinechlorid(e) (3a890): 400,0 mg, Calcium-D-pantothenaat/ Calcium-D-Pantothenat/ Calcium D-pantothenate (3a841): 60,0 mg, Vitamin(e) B6 (3a831): 9,0 mg, Foliumzuur/ Folsäure/ Folic acid (3a316): 1,8 mg, Vitamin(e) B12 (cyanocobalamin): 41,6 mcg, Vitamin(e) C (3a300): 60,0 mg, Biotin(e) (3a880): 700,0 mcg, L-Carnitin(e) (3a910): 46,0 mg, L-lysin(e)monohydrochlorid(e) (3c322) 2536,0 mg, DL-Methionin(e) (3c301) 75,2 mg, L-Threonin(e) (3c410) 225,6 mg, L-Tryptofaan/ L-Tryptophan (3c440) 56,4 mg, L-Valin(e) (3c370) 249,6 mg, 3b103 ijzer(II)sulfaat monohydraat/ Eisen(II)-sulfat-Monohydrat/ Iron(II) sulphate monohydrate: 20,0 mg, 3b201 Kaliumjodid(e)/ Potassium iodide: 4,0 mg, 3b405 Koper(II)sulfaat pentahydraat/ Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat/ Copper(II) sulphate pentahydrate: 12,0 mg, 3b605 Zinksulfaat monohydraat/ Zinksulfat Monohydrat/ Zinc sulphate monohydrate: 22,0 mg, 3b607 Zinkchelaat van glycinehydraat (vast)/ Glycin-Zinkchelate-Hydrate (fest)/ Zinc chelate of glycine hydrate (solid): 40,0 mg, 3b502 Mangaan(II) oxide/ Mangan(II)-oxid/ Manganese(II)oxide: 20,0 mg, 3b506 Mangaanchelaat van glycine, gehydrateerd/ Glycin-Manganchelate-Hydrate/Manganese chelate of glycine hydrate: 40,0 mg, 3b801 Selenium, Natriumseleniet/ Natriumselenit/ Sodium selenite: 0,4 mg

Bevat EG toegestane antioxidanten / Enthält EU zugelassene Antioxidantien / Contains EC permitted antioxidants

Gebbruiksaanwijzing: gelijktijdige toediening met drinkwater waaraan cholinechloride is toegevoegd, moet worden vermeden. Het geniet aanbeveling om voor volledige diervoeders het niveau van 1000 mg aanvullende cholinechloride /kg niet te overschrijden. Het product bevat 16000,0 IE vitamine A. Het aanvullende diervoeder mag daarom max. 64 % deel uitmaken van het volledige dagrantsoen.

Gebrauchsanweisung: die gleichzeitige Verwendung mit Trinkwasser, dem Cholinchlorid zugesetzt wurde, sollte vermieden werden. Es wird ein Ergänzungsgehalt von höchstens 1000 mg Cholinchlorid /kg Alleinfuttermittel empfohlen. Das Produkt enthält 16000,0 IE Vitamin A. Das Ergänzungsfuttermittel darf daher maximal 64% der gesamten Tagesration ausmachen.

Instructions of use: simultaneous use with water for drinking in which choline chloride has been added should be avoided. Recommended not to exceed supplemental levels of 1000 mg of choline chloride /kg of complete feed. The product contains 16000,0 IU of vitamin A. The complementary feed may therefore form a maximum of 64% of the complete daily ration.